

'ANANAS BERŻENICKI'

Synonimy

'Berżininkų ananasas'

Pochodzenie

Odmiana polska



Fot. Grzegorz Hodun

Rodowód

Nieznany

Drzewo

Bardzo duże, korona kulista, lekko się zagęszczająca, z dosyć sztywnymi pędami. Wchodzenie w owocowanie niezbyt wczesne. Plonowanie średnio obfite, częściowo przemienne.

Podatność na choroby

Mała

Wytrzymałość na mróz

Duża

Owoce

Duże, kuliste lub stożkowatokuliste, zwykle lekko spłaszczone, zielonkawożółte lub białawożółte, nierzadko z niewielkim, delikatnym, pomarańczowoczerwonym, rozmytym rumieńcem. Kielich duży, zamknięty lub półotwarty. Szypułka umiarkowanie gruba, krótka. Miąższ żółtawobiały, zwięzły, soczysty, kwaskowatosłodki, aromatyczny, czasami ze szklistością.

Dojrzałość zbiorcza

Druga połowa sierpnia

Dojrzałość konsumpcyjna

Do dwóch tygodni po zbiorze

Właściwości użytkowe:

Owoce do bezpośredniego spożycia i przerobu na sok

Praca wykonana w ramach dotacji celowej MRiRW

Zadanie 1.2. Zachowanie *ex situ* zasobów genowych ogrodnich roślin użytkowych.