

# 'ANNA SPÄTH'

**Synonimy:**

'Anna Szpet', 'Anna Späthová'

**Pochodzenie:**

odmiana znaleziona na Węgrzech w 1870 r.,  
a wprowadzona do uprawy przez zakład szkółkarski Späth w Berlinie.



fot. Agnieszka Głowacka

**Rodowód:**

nieznany

**Drzewo:**

rośnię średnio silnie. Tworzy kulistą koronę. Średnio wczesnie wchodzi w okres owocowania. Owocuje zwykle regularnie, obficie lub średnio obficie. Odmiana samopylna.

**Podatność na choroby:**

mała

**Wytrzymałość na mróz:**

duża

**Owoce:**

średniej wielkości, o masie 35-45g, owalne. Skórka brunatnofioletowa, na całej powierzchni pokryta jasnym nalotem i licznymi, nieregularnymi przetchlinkami. Miąższ zielonożółty, średnio jędrny, soczysty. Smak zależy od warunków pogodowych w czasie dojrzewania. Pestka średniej wielkości, owalna, zwykle niezbyt dobrze oddzielająca się od miąższu.

**Termin zbioru:**

od końca września do połowy października

**Właściwości użytkowe:**

odmiana deserowa i przetwórcza

Praca wykonana w ramach dotacji celowej MRiRW

Zadanie 1.2. Zachowanie *ex situ* zasobów genowych ogrodnictwa roślin użytkowych.