

'BRZOSKWINIOWA'

Synonimy:

'Jerozolimka'

Pochodzenie:

ostatecznie nieustalone, prawdopodobnie odmiana angielska



fot. Agnieszka Glowacka

Rodowód:

nieznany

Drzewo:

rośnie silnie. Początkowo tworzy wyniosłą, a w starszym wieku bardziej rozłożystą koronę. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie. Owocuje średnio obficie i zwykle przemiennie. Odmiana obcopylna.

Podatność na choroby:

średnio duża na szarkę i mała na inne choroby śliwy

Wytrzymałość na mróz:

mała

Owoce:

duże, o masie 50-55g, kuliste, na wierzchołkach wyraźnie spłaszczone. Skórka początkowo zielonożółta, a u owoców w pełni dojrzałych różowożółta, pokryta bordowoczerwonym rumieńcem, zajmującym prawie całą jej powierzchnię oraz jasnym nalotem woskowym. Miąższ żółty, dość zwarty, soczysty, bardzo smaczny. Oddzielanie miąższu od pestki w dużej mierze zależy od stanowiska, na którym rosną drzewa. Pestka dość duża, szerokoeliptyczna.

Termin zbioru:

w pierwszej dekadzie sierpnia

Właściwości użytkowe:

odmiana deserowa

Praca wykonana w ramach dotacji celowej MRiRW

Zadanie 1.2. Zachowanie *ex situ* zasobów genowych ogrodnictwa roślin użytkowych.